



ที่ นມ ๗๙๘๐๑/ว ๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะໄລ
อำเภอแก้งสนามนาง นມ ๓๐๔๕๐

๖๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงพะໄລหมู่ที่ ๑-๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะໄລ พบรากระบัดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีถุงลาย เป็นพาหะนำโรค และมีแนวโน้มที่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดเหตุรุ่มภัยเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแนวทาง ดังนี้

๑. การติดต่อของโรคไข้เลือดออก มีถุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. แหล่งเพาะพันธุ์ถุงลาย ได้แก่ ภาชนะน้ำขังใส เศษวัสดุที่สามารถน้ำขังได้ เช่น กระป๋อง ย่างรถ กะหล่อกกะลา แจกนัน ถ้วยรองชาตู้ งานรองกระถางดอกไม้ ฯลฯ
๓. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ถุงลาย ใช้หลัก ๕ ป. ๊ ๊
- ๓.๑ ปิดภาชนะด้วยฝาปิดป้องกันถุงลายวางไว้
- ๓.๒ เปลี่ยนน้ำทุกสักดาวท์ เพื่อป้องกันไข้ถุงลายเปลี่ยนเป็นถุงลาย
- ๓.๓ ปล่อยปลากินลูกน้ำ
- ๓.๔ ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม/บ้านเรือนให้สะอาด ลดแหล่งเพาะพันธุ์ถุงลาย
- ๓.๕ ปฏิบัติเป็นประจำสำหรับเด็กนุ่มนิ่ม แล้วเทน้ำ

ขัดล้างบนพื้นดิน ปล่อยให้ไข้แห้งตาย

กรณี หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน ๓๘.๕ องศาเซลเซียส หรืออาจสูงถึง ๔๐-๔๑ องศาเซลเซียส มีจุดออกเลือกๆกระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดา ออกตามไรฟัน ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศาสตร์ เพียงพาณิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะໄລ

สำนักงานปลัด

งานสาธารณสุข

โทร. ๐๔๔-๗๔๕๒๖๔, ๐๘-๘๘๔๖-๕๑๘๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ສູງເມືດທີ່ແກ່ຕະຫຼາມລະບົບເຫັນວ່າມີມາດີເປັນເປົ້າ



ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ក្រសួងបណ្តោះសាយ



۱۶۹

ເສດຖະກິດ

ເບີນມາຮັບຮັດໃຫຍ້ວິໄລ ຖະແຫຼງກົມພູມພູມ
ອັນໄຕກາຣີກົມພູມພູມ

ԱՐՄԵՆԻԱ

၁၆၂၃




ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່ ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່
ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່ ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່
ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່ ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່
ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່ ພະຍານດີເກີດໃຫຍ່

การศึกษาทางเสียงตัว言 มีอิทธิพลต่อเสียงผู้ชายมากกว่าเด็กชายในประเทศไทย



•
८३



การดูแลรักษาแม่ปืนไข่เลือดออก

โดยทั่วไปจะรักษาตามอาการและความรุนแรงของอาการ ไม่รุนแรงจะหายได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยารักษาในรายที่น้อยอาการรุนแรงให้รักษาตามอาการ ดังนี้

ถ้าผู้ป่วยไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำแข็งตัวเพื่อคลายไข้

และป้องกันอาการแพ้จากไข้สูง

หากจำเป็นต้องให้ยาตัดไข้ ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาเม็ดสีพิริน เพราะจะทำให้เหตุผลคุณประดิษฐ์แตกจ่าย

ถ้าผู้ป่วยมีอาการร้อนแพ้หรือไข้ดันน้ำเหลืองน้ำตาลไม่มีหรือน้ำตาลแตกเฉียบเร่งอย่าง

ให้รับประทานอาหารร้อนแพ้หรือไข้ดันน้ำเหลือง เช่น

ข้าวต้ม โจ祺 นุ้ย ผ้าหวาน

ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดอาการหน้าซื้อก็ต้องนำส่วนยอก กระซิบกระซิบส่วนที่ร้อน เช่น ร้อนปากเขียว พังโญฯ กัน ปลูกดอง ใช้รดน้ำเพื่อระบาย

โรงพยาบาลพันธุ์

การป้องกันโรคไข่เลือดออก

❖ หลีกเลี่ยงไปที่บึงค่าภัยต่อไปให้ติดภูมานางในเวลาต่างวันหรือไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่มีแมลงอ้วนคุ้น

❖ ทำลายบุญตัวแม่ตัวราจรรากไม้และเศษใบไม้

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ทำความสะอาดพื้นบ้านอยโดย

1. บีบฝ่าเท้าชนเดือนหน้าให้มีครีด

2. ใส่ปลอกกันบุกหน้า เช่น ปลากะนาภัยหรือปลา กัดในภาษาชนเดือนหน้าที่บีบฝ่าไม้ได้

3. ทำลายภาชนะที่มีน้ำซึ่งอาจเป็นไข่สีตัวอุกกา

4. ใส่กระเบน เทศอ น้ำเต้มตะหยุด หรือผงซักผ้า ลงซักผ้าลงในภาชนะที่ต้องห้ามหรือภาชนะที่มีน้ำซึ่ง

5. หมั่นตรวจสอบน้ำซึ่งลงในภาชนะที่ไม่จำเป็น เช่น ทั่งในและนอกบ้านทุก 7 วัน ถ้าพบให้ทำลายในและนอกบ้านทุก 7 วัน ทันที



สาระน่ารู้

▶ สามารถรักษาแม่ปืนไข่เลือดออกตั้งแต่วันแรกหรือไม่

▶ ไม่สามารถรักษาแม่ปืนไข่เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1-2 วันแรกจะไม่สามารถแยกจากโรคอื่นๆ ได้จำเป็นต้องนัดมาตรวจร่างกายและอาศัยการตรวจเต็มคัด

▶ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไข่เลือดออก

- ผู้ป่วยจะมีไข้สูงตลอด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการหน้าแดง มีจุดเคลลงๆ หรืออุดเส้นเลือดยกเส้นๆ ตามแขน เขียน ขา รักแร้ แดงดำตัว เส้นเลือดบนหนังตัวเป็นสีฟ้า ไข้สูงติดต่อจากคนไข้

▶ หากรักษาแม่ปืนไข่เลือดจะเป็นไข่สีตัวอุกกา

- ไม่ริงทุกราย มีตัวโรคสามารถทำให้เกิดไข้ ได้โดยแบ่งไข่เลือดออกได้ชั้นกัน

▶ เมื่อทราบว่าเป็นไข่เลือดจะยกยาและต้องดูแลอย่างไร

- รักษาตามอาการ เช่น ถ้าไข่สูงควรให้ยาลดไข้ตามมาตรฐาน ก็ต้องดูแลอย่างดี ควบคุมไข้ ให้ร้อนในประมาณ 38-39 องศาเซลเซียส เนื่องตัวป่วยฯ ลำบากน้ำอุ่น ให้ร้อนประสาหานาหาร่อนๆ และเผาติดตามอาการน้ำก้อนซึ่งออกเพื่อช่วยเหลือไข่สีตัวอุกกา

ทันที